

# Informacja dotycząca choroby niebieskiego języka

**CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA (Bluetongue)** jest chorobą zwierząt przeżuwających, zarówno domowych jak i dzikich wywołaną przez wirusy. Choruje bydło, owce i kozy, ale także sarny, jelenie, afrykańskie antylopy czy wielbłądy.

Zwierzęta nie zarażają się bezpośrednio od siebie, a jedynie poprzez owady kłująco - ssące z rodzaju *Culicoides* (rodzina: kuczmany) oraz poprzez krew lub nasienie.

Choroba nie przenosi się na inne gatunki zwierząt gospodarskich i domowych oraz na ludzi.

**Oznacza to, że mięso, mleko, skóry i wełna oraz inne produkty pochodzące od przeżuwaczy nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi.**

**Choroba podlega obowiązkowi zwalczania na terenie RP !!!**

## Objawy u bydła:

U bydła częstość zachorowań jest wyższa niż u owiec, choć zwykle nie obserwuje się tak wyraźnych objawów klinicznych choroby. Na zakażenie wirusem wrażliwe są płody, szczególnie w fazie rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Stąd w wyniku zakażenia dochodzi do wodogłowia płodu i deformacji wrodzonych.

**Bydło po przechorowaniu może stać się nosicielem, co prowadzi do zakażenia kuczmanów i przenoszenia choroby za ich pośrednictwem na zwierzęta zdrowe.**

**Objawy kliniczne u krów dorosłych mogą nie być widoczne nawet do 60-80 dnia po zakażeniu. Jednakże jeśli wystąpią, można zaobserwować:**

- gorączkę,
- zapalenie mięśni,
- ślinienie,
- zaczerwienienie, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej jamy ustnej oraz innych eksponowanych nabłonków, głównie strzyków,
- owrzodzenie opuszki zębowej i niekiedy końca języka;
- zapalenie koronki i tworzywa racic;
- u krów mlecznych - łuszczenie się naskórka strzyków wraz z tworzeniem się strupów,
- niepłodność i ronienia, rodzenie zdeformowanych i słabych cieląt.

## Objawy u owiec:

- posmutnienie, depresja
- gorączka powyżej 41°C,
- stan zapalny jamy ustnej,
- sinica warg i języka,
- owrzodzenie warg, opuszki zębowej oraz w niektórych przypadkach języka;
- obrzęki, skręcanie głowy i wymioty,
- zapalenie koronki i tworzywa racic powodujące kulawiznę, sztywny chód i zrucie puszek racicowej,
- u zakażonych samic ciężarnych może dochodzić do poronień lub rodzenia zdeformowanych jagniąt.

## Główny Lekarz Weterynarii zaleca hodowcom przeżuwaczy:

- **wystrzegać się zakupu zwierząt do własnej hodowli pochodzących z niewiadomego źródła, bez świadectw zdrowia,**
- **zapewnić okresowe wizyty lekarza weterynarii w gospodarstwie,**
- **jak najszybciej zgłaszać lekarzowi weterynarii wszelkie podejrzane objawy kliniczne oraz „nienormalne” zachowanie się zwierząt,**

- zwalczać owady w pomieszczeniach inwentarskich, w których przebywają zwierzęta.

---

